새로운 생각 키우기
올바른 마음 가꾸기
튼튼한 체력 기르기

대성 가정 통신
11월 보건소식지

2022-128호

전화: 031-584-0621
FAX: 031-584-9226

어린이 인플루엔자 국가예방접종 안내

학부모님 안녕하십니까?
2022~2023절기 인플루엔자 국가예방접종이 시행되어 안내드리니, 아래의 내용을 참고하시기 바랍니다.

지원대상	**생후 6개월 ~ 만13세 어린이(2009.1.1.~2022.8.31.출생아)**
지원내용	**인플루엔자 백신접종**
접종기관	**※ 전국 예방접종 지정의료기관 및 보건소** - 지정의료기관은 **예방접종도우미 누리집**(https://nip.cdc.go.kr) 및 스마트폰앱에서 확인 가능하며, **일부 보건소는 어린이접종을 미실시하므로 반드시 방문 전 확인 필요**
접종기간	• **1회 접종대상자: 22. 10. 5(수) ~ 23. 4. 30(일)** • **2회 접종대상자: 22. 9. 21(수) ~ 23. 4. 30(일)** **※ 2회 접종대상자: 생후 6개월~만 9세미만 소아 중 다음 대상자는 2회 접종 지원됨** **- 인플루엔자 예방접종을 처음하거나 이전 접종력을 모르거나, 2022-2023절기 전까지 인플루엔자 백신을 총 1회만 접종한 경우**
기타 안내사항	• **반드시 부모님께서 동반**하되, **부득이하게 부모님 동반이 불가한 경우 보호자가 작성한 '예방접종 시행 동의서' 및 '예방접종 예진표' 지참 시 의사 예진 후 접종 가능** • **예방접종 전후 주의사항, 이상반응 등 반드시 사전숙지 필요**
예방접종 전·후 주의사항	• 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다. • 건강상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다. • 예방접종 전, 아픈증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다. • 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다. • 접종 부위는 청결하게 유지합니다. • 접종 후 2~3일간은 특별한 관심을 가지고 자녀를 관찰하고, 고열 등 평소와 다른 신체증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다. **※ 예방접종을 하면 안되는 경우** • 과거 인플루엔자 백신접종 후 중증(생명을 위협하는) 알레르기 반응이 있었던 경우 (인플루엔자 백신접종 후 6주이 내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람은 예방접종 시 주의가 필요합니다.) • 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우
예방접종 후 발생 가능한 이상반응	• 국소 이상반응: 접종 부위가 빨갛게 부어오름, 통증 • 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등 경미한 이상반응은 예방 접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일내 호전됩니다. 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

계란 알레르기 어린이를 위한 인플루엔자 국가예방접종 지원

지원대상	**계란 알레르기 치료 및 진단을 받은 환아** **-〉 생후 6개월 이상 ~ 만 18세 이하 어린이(2004.1.1.~2022.8.31. 출생)**
지원백신	**세포배양 인플루엔자 4가 백신(플루셀박스 1회 접종)**
접종기관	**※ 세포배양 백신이 공급된 보건소 및 지정 의료기관** **** 예방접종도우미 누리집 -〉 예방접종관리 -지정의료기관찾기 -〉** **인플루엔자 국가예방접종지원사업 지정의료기관 -〉 세포배양 인플루엔자 백신**
접종기간	**• 2022. 10. 20. (목) ~ 백신 소진시까지**
접종방법	**• 의사소견서, 진단서 또는 접종의뢰서 제출** **(단 생후 6개월 이상 ~ 만 18세 이하 어린이 중 21-22절기 세포배양 백신 접종이력이 있는 어린이는 별도 서류 없이 접종가능)** **※ 접종의뢰서 내려받기 -〉 예방접종 도우미 누리집 -〉 예방접종알림터 -〉 공지사항** **※ 접종대상에 해당하는 환아에게 접종의뢰서를 작성하여 접종 가능한 보건소 및 지정의료기관에 의뢰하여 주시기 바랍니다.**
예방접종 전·후 주의사항	• 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다. • 건강상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다. • 예방접종 전, 아픈증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다. • 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다. • 접종 부위는 청결하게 유지합니다. • 접종 후 2~3일간은 특별한 관심을 가지고 자녀를 관찰하고, 고열 등 평소와 다른 신체증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다. **※ 예방접종을 하면 안되는 경우** • 과거 인플루엔자 백신접종 후 중증(생명을 위협하는) 알레르기 반응이 있었던 경우 (인플루엔자 백신접종 후 6주이 내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람은 예방접종 시 주의가 필요합니다.) • 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우
예방접종 후 발생 가능한 이상반응	• 국소 이상반응: 접종 부위가 빨갛게 부어오름, 통증 • 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등
	경미한 이상반응은 예방 접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일내 호전됩니다. 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

2022년 10월 28일

대성초등학교장